

Composition

Beponil Tablet: Each film coated tablet contains Bepotastine Besilate INN 10 mg.

Pharmacology

Bepotastine besilate is an H₁ receptor antagonist and an inhibitor of histamine release from mast cells. Bepotastine inhibits the internal production and activity of histamines which cause allergic symptoms, and it thus improves rhinitis symptoms, such as sneezing, runny nose, and stuffed nose and itch.

Indication

Beponil is a histamine H₁ receptor antagonist indicated for the treatment of Allergic rhinitis and Urticaria.

Dosage & Administration

For adults: One beponil tablet (10 mg), twice a day. The dose may be adjusted according to your age and symptoms.

For children aged 7 years and older: One Beponil tablet (10 mg), twice a day.

Contraindication

Beponil is contraindicated in patients with a history of hypersensitivity reactions to bepotastine or any of the other ingredients.

Warning & Precaution

Beponil may cause drowsiness. Be aware of driving a car or operating dangerous machinery. Do not use for patients with renal disorder.

Side Effects

The most commonly reported adverse reactions include drowsiness, dry mouth, nausea, vomiting, gastric pain, diarrhea, gastric discomfort, malaise and hives.

Use in Pregnancy and Lactation

Pregnancy Category C. Do not use for pregnant or breastfeeding women.

Pediatric Use

Safety and efficacy have not been established in pediatric patients under 2 years of age.

Drug Interactions

No drug interactions observed but patients who are sensitive to this product molecule should be used with caution.

Overdose

There is limited information regarding overdose of Bepotastine Besilate in the drug label.

Storage

Store below 30°C and dry place, away from light and moisture. Keep out of the reach of children.

Packaging

Beponil Tablet: Each commercial box contains 30 tablets in Alu-Alu blister pack.

উপাদান

বেপোটাস্টিন ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে বেপোটাস্টিন বেসিলেট আইএনএন ১০ মিগ্রা।

ফার্মাকোলজি

বেপোটাস্টিন বেসিলেট একটি H₁ রিসেপ্টর প্রতিপক্ষ (antagonist) এবং মাস্ট সেল থেকে হিস্টামিন নিঃসরণ প্রতিরোধকারী। এটি দেহের অভ্যন্তরে হিস্টামিনের উৎপাদন এবং কার্যকারিতা প্রতিরোধ করে, যা অ্যালার্জিক লক্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে এটি হাঁচি, নাক থেকে পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া এবং চুলকানি সহ রাইনাইটিসের উপসর্গগুলোর উন্নতি ঘটায়।

নির্দেশনা

বেপোনিল একটি হিস্টামিন H₁ রিসেপ্টর প্রতিরোধক, যা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এবং আর্টিকারিয়া (চর্মে চুলকানি ও ফুসকুড়ি) চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধি

প্রাণবয়স্কদের জন্য: প্রতিদিন ১টি করে বেপোনিল ট্যাবলেট (১০ মিগ্রা) দিনে দুইবার গ্রহণ করুন। বয়স ও উপসর্গ অনুযায়ী ডোজ সমন্বয় করা যেতে পারে।

৭ বছর এবং তার বেশি বয়সী শিশুদের জন্য: প্রতিদিন ১টি করে বেপোনিল ট্যাবলেট (১০ মিগ্রা) দিনে দুইবার গ্রহণ করুন।

প্রতিনির্দেশনা

বেপোটাস্টিন বা এর যে কোনো উপাদানের প্রতি যাদের অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া থাকার ইতিহাস রয়েছে তাদের জন্য বেপোনিল নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা ও সাবধানতা

বেপোনিল ঘুমঘুম ভাবের কারণ হতে পারে। গাড়ি চালানো বা বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি পরিচালনার সময় সতর্ক থাকুন। যাদের কিডনিজনিত জটিলতা রয়েছে, তাদের এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সর্বাধিক সাধারণভাবে রিপোর্ট করা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘুমঘুম ভাব, মুখ শুষ্কতা, বমিভাব, বমি, পেটব্যাথা, ডায়রিয়া, পেটে অস্বস্তি, দুর্বলতা এবং চুলকানি (হাইভস)।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

প্রোগনোসিস ক্যাটাগরি সি। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী নারীদের জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে বেপোনিলের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

বেপোটাস্টিন ব্যবহারে কোনো উল্লেখযোগ্য ওষুধের পারস্পরিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। তবে, যেসব রোগী এই ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রাধিক্য

বেপোটাস্টিন বেসিলেট-এর ওষুধ লেবেলে ওভারডোজ সম্পর্কিত তথ্য সীমিত।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ৩০° সেলসিয়াস এর নিচে ও শুকনো স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

মোড়ক সামগ্রী

বেপোনিল ট্যাবলেট: প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।