

# Art work of Pidonex tablet insert

# Pidonex

Pidotimod INN

## Composition

**Pidonex 400 Tablet:** Each film coated tablet contains Pidotimod INN 400 mg.

**Pidonex 800 Tablet:** Each film coated tablet contains Pidotimod INN 800 mg.

## Pharmacology

### Mechanism of Action

Pidotimod works as immunostimulant by enhancing innate as well as adaptive immune responses.

## Indication

1. Recurrent Upper and Lower Respiratory tract infections in children and Adults.
2. Acute Respiratory Tract Infections.
3. Asthma.
4. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases.
5. Chronic Bronchitis.
6. Immunological Disorders.

## Dose and Administration

Pidotimod is recommended for 60 days therapy in following dosing pattern:

### Children:

First 15 days: 400 mg twice daily

Remaining 45 days: 400 mg once daily.

### Adults:

First 8 days: 800 mg twice daily

Rest 52 days: 800 mg once daily.

## Contraindication

Pidotimod is contraindicated in patients with known hypersensitivity to any of its ingredients.

## Warning and Precaution

In subjects predisposed to allergic reactions (atopic) or with a history of allergic reactions, the preparation should be administered with caution.

In patients with congenital immune deficiencies (hyper-IgE syndromes) the medicine should be used with caution.

## Side Effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Uncommon effects (may affect up to 1 in 100 people)

- abdominal pain
- diarrhea
- rash

Rare effects (may affect up to 1 in 1,000 people)

- swelling of the face, tongue and windpipe causing great difficulty in breathing and which is a sign of a severe allergic reaction (angioedema)
- small patches on the skin accompanied by itching (urticaria)
- allergic skin inflammations (allergic dermatitis)
- itching

## Use in Pregnancy and Lactation

### In Pregnancy

There are no adequate and well controlled studies in pregnant woman. Pidotimod tablet should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

### Lactation

It is recommended to avoid the use of Pidotimod during the first three months of pregnancy and while breastfeeding.

## Drug Interaction

No interaction was found or established.

## Storage

Store in a cool (below 30°C) and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

## Packing

**Pidonex 400 Tablet:** Each Commercial box contains 10 tablets in ALU-ALU blister pack.

**Pidonex 800 Tablet:** Each Commercial box contains 10 tablets in ALU-ALU blister pack.

Manufactured By

**BEACON**

Pharmaceuticals PLC

Bhaluka, Mymensingh, Bangladesh

LF48201

# পিডোনেক্স

পিডোটিমড আইএনএন

## উপাদান

পিডোনেক্স ৪০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে পিডোটিমড আইএনএন ৪০০ মিগ্রা।

পিডোনেক্স ৮০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে পিডোটিমড আইএনএন ৮০০ মিগ্রা।

## ফার্মাকোলজি

### কার্যপদ্ধতি

পিডোটিমড সহজাত এবং অভিয়োজিত প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ইমিউনোস্টিমুল্যান্ট হিসাবে কাজ করে।

## নির্দেশনা

১. শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বারবার উর্ধ্ব এবং নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ।

২. তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ।

৩. হাঁপানি।

৪. ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ।

৫. ক্রনিক ব্রংকাইটিস।

৬. ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার।

## মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

পিডোটিমড ৬০ দিনের থেরাপির জন্য সুপারিশ করা হয়:

### শিশু:

প্রথম ১৫ দিন: ৪০০ মিগ্রা দিনে দুবার

বাকি ৪৫ দিন: প্রতিদিন একবার ৪০০ মিগ্রা।

### প্রাপ্তবয়স্ক:

প্রথম ৮ দিন: ৮০০ মিগ্রা দিনে দুবার

বাকি ৫২ দিন: প্রতিদিন একবার ৮০০ মিগ্রা।

## প্রতিনির্দেশনা

পিডোটিমড এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

## পূর্বসতর্কতা

অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া (অ্যাটোপিক) বা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সহ প্রবণতার ক্ষেত্রে, পিডোটিমড সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা উচিত।

জন্মগত ইমিউন ঘাটতি (হাইপার-আইজিই সিড্রোম) রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধটি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সমস্ত ওষুধের মতো, এই ওষুধটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যদিও সবাই সেগুলি পায় না। অস্বাভাবিক প্রভাব (১০০ জনের মধ্যে ১ জনকে প্রভাবিত করতে পারে)

\* পেটে ব্যথা

\* ডায়রিয়া

\* ফসকুড়ি বিরল প্রভাব (১,০০০ জনের মধ্যে ১ জনকে প্রভাবিত করতে পারে)

\* মুখ, জিহ্বা এবং বাতাসের পাইপ ফুলে যাওয়ার ফলে শ্বাস নিতে খুব অসুবিধা হয়

এবং যা একটি গুরুতর অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ (এনজিওডেমা)

\* ত্বকে ছোট ছোট দাগ সহ চুলকানি (আর্টিকারিয়া)

\* অ্যালার্জিক ত্বকের প্রদাহ (অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস)

\* চুলকানি

## গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

### গর্ভাবস্থায়

গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে কোন পর্যাপ্ত এবং ভাল নিয়ন্ত্রিত গবেষণা নেই। পিডোটিমড ট্যাবলেটটি গর্ভাবস্থায় শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা উচিত যদি সম্ভাব্য সুবিধা ঝুণের সম্ভাব্য ঝুঁকিকে সমর্থন করে।

### স্তন্যদানকালে

গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় পিডোটিমড ব্যবহার এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

## অন্যান্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া

অন্যান্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত বা পাওয়া যায় নি।

## সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা (৩০°C সেলসিয়াস এর নিচে) ও শুকনো স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## মোড়ক সামগ্রী

পিডোনেক্স ৪০০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

পিডোনেক্স ৮০০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

## প্রস্তুতকারক

বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস্ পিএলসি

ভালুকা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

Width 82 mm

Length 300 mm