

Rabepes

Rabeprazole Sodium BP

COMPOSITION

Rabepes MUPS tablet: Each MUPS (Multiple Unit Pellet System) Tablet contains Rabeprazole Sodium enteric coated pellets Ph. Grade equivalent to Rabeprazole Sodium BP 20 mg.

Rabepes M10 tablet: Each MUPS (Multiple Unit Pellet System) Tablet contains Rabeprazole Sodium enteric coated pellets Ph. Grade equivalent to Rabeprazole Sodium BP 10 mg.

Rabepes Capsule: Each capsule contains Rabeprazole Sodium BP 20 mg (As Enteric Coated Pellets).

DESCRIPTION

Rabepes Capsule/ Rabepes MUPS/ Rabepes M10 is a specific inhibitor of the gastric enzyme, H⁺/K⁺-ATPase (the proton pump) which is responsible for acid secretion by the parietal cells of the stomach. Besides, Rabeprazole Sodium stimulates gastric mucin production (main component of gastric mucus which gives protection to stomach against gastric acid).

MUPS TECHNOLOGY

MUPS is the latest technology which combines the power of both tablets and pellet-filled capsules in one single dosage form.

CLINICAL ADVANTAGES OF RABEPRAZOLE SODIUM MUPS TABLET

- Ensures greater bioavailability.
- Ensures uniform drug release.
- Once daily dosing.
- Ensures lesser possibility of dose dumping.
- Ensures lesser chance of localized irritation.
- Ensures uniform emptying of micro pellets from stomach into small intestine

PHARMACODYNAMIC ADVANTAGES

- MUPS ensure rapid and uniform gastric emptying and subsequently uniform drug dissolution of pellets in the gastrointestinal tract due to their small size and larger surface, uniform drug absorption is facilitated which results in consistent and controlled pharmacological action.
- A further reduction in inter-subject variability in drug absorption and clinical response is facilitated since the number of pellets per MUPS dosage form is much more than a conventional pellet-filled capsule and possibility of dose dumping (in stomach) and incomplete drug release is further minimized.

INDICATIONS

- NSAID-induced gastric ulcer.
- Duodenal ulcer.
- GERD (Gastroesophageal Reflux Disease).
- Reflux Oesophagitis.
- Zollinger-Ellison Syndrome.
- Eradication of H. pylori with appropriate antibiotics.

DOSAGE & ADMINISTRATION FOR RABEPES MUPS TABLET



Indication	Dosage & Administration	Duration
NSAID induced gastric ulcer	20 mg once daily	4-8 weeks.
Treatment of Active Duodenal Ulcer	20 mg once daily	4-8 weeks.
Benign Gastric Ulcer	40 mg once daily	4-8 weeks.
Treatment of Symptomatic GERD	20 mg once daily	4 weeks.
Helicobacter pylori eradication	20 mg with Amoxicillin 1000 mg & Clarithromycin 500 mg together twice daily	7 days.
Zollinger-Ellison syndrome	40-80 mg twice daily	As long as clinically indicated by physician
Short-term treatment of symptomatic GERD in adolescent patients 12 years of age and older	20 mg once daily	4-8 weeks.
symptomatic GERD in Children of 1 to 11 years	Less than 15 kg: 5 mg Once daily with the option to increase to 10 mg if inadequate response 15 kg or more: 10 mg once a day	12 weeks.

TAKE THE MUPS TABLET BEFORE OR AFTER MEAL:

Swallow the MUPS tablet whole with a glass of water. The tablet must not be chewed or crushed.

Or

If the patients have trouble swallowing the MUPS tablet, put it into a glass of water (Do not use other liquids). Stir the preparation until the MUPS tablet disintegrate. Then drink the liquid within 30 minutes. Stir the mixture just always before drinking.



DOSAGE AND ADMINISTRATION FOR RABEPES CAPSULE:

Duodenal Ulcers

Adults : 20 mg/day for 4 weeks; additional therapy may be required for some patients.

Short-Term Treatment of GERD

Adults and children 12 years and older : 20 mg once daily for up to 8 weeks.

Erosive or Ulcerative GERD

Adults : 20 mg/day for 4 to 8 weeks; an additional 8 weeks may be considered for patients who do not heal. For the maintenance healing of GERD, 20 mg/day.

Pathological Hypersecretory Conditions

Adults : 60 mg/day. Adjust dose to individual patient needs. Doses up to 100 mg daily or 60 mg twice daily have been administered.

H. Pylori Eradication

Adults : Rabeprazole Sodium 20 mg plus Amoxicillin 1,000 mg plus Clarithromycin 500 mg twice daily for 7 days with morning and evening meals.

General Advice: Capsules should be swallowed whole; do not chew, crush or split. May take with or without food.

SIDE EFFECTS: Diarrhea, Nausea & Abdominal pain.

CONTRAINDICATION: Rabeprazole Sodium is contraindicated in those patients who have known hypersensitivity to any other components of the formulation.

PRECAUTION: Rabeprazole Sodium should be used carefully if the patient has severe liver dysfunction and severe renal impairment.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION

No data are available on administration of Rabeprazole Sodium to pregnant women. However this drug should be used during pregnancy, only if clearly needed. There are no data on the excretion of Rabeprazole Sodium into the breast milk. A decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the benefit of the drug to the mother.

DRUG INTERACTION: Possible interaction with Warfarin, Cyclosporine, Ketoconazole, Iron Salts, Digoxin, Mycophenolate mofetil, Atazanavir, Methotrexate.

Storage Conditions for Rabepes MUPS tablet: Store below 25°C and in dry place, away from light and moisture. Keep out of the reach of children.

Storage Conditions for Rabepes capsule: Store below 30° C and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

HOW SUPPLIED

Rabepes MUPS tablet: Each box contains 5 x 10's tablets in Alu-Alu blister pack.

Rabepes M10 tablet: Each box contains 3 x 10's tablets in Alu-Alu blister pack.

Rabepes Capsule: Each commercial box contains 5 X 10's capsules in Alu-Alu blister pack.

Manufactured By

BEACON[®]
Pharmaceuticals PLC

Bhaluka, Mymensingh, Bangladesh

র্যাবিপেস

র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম বিপি

উপাদান

র্যাবিপেস মাপস ট্যাবলেট : প্রতিটি মাপস ট্যাবলেটে আছে র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম এক্টেরিক কোটেড পিলেটস ফার্মা গ্রেড এর সমতুল্য র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম বিপি ২০মিগ্রা।

র্যাবিপেস এম১০ ট্যাবলেট : প্রতিটি মাপস ট্যাবলেটে আছে র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম এক্টেরিক কোটেড পিলেটস ফার্মা গ্রেড এর সমতুল্য র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম বিপি ১০মিগ্রা।

র্যাবিপেস ক্যাপসুল : প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম বিপি ২০মিগ্রা (এক্টেরিক কোটেড পিলেটস)।

বিস্তারিত

র্যাবিপেস ক্যাপসুল/ র্যাবিপেস মাপস/ র্যাবিপেস এম১০ গ্যাস্ট্রিক এনজাইম, হাইড্রোক্সেন-পটাসিয়াম এটিপেজ (প্রোটন পাম্প) এর স্পেসিফিক ইনহিবিটর যা পাকস্থলির প্যারাইটাল সেল থেকে এসিড নিঃসরণ এর জন্য দায়ী। এছাড়াও র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম- গ্যাস্ট্রিক মিউসিন (গ্যাস্ট্রিক মিউকাসের প্রধান উপাদান যা পাকস্থলিকে গ্যাস্ট্রিক এসিড থেকে সুরক্ষা দেয়) -এর উৎপাদন ত্বরান্বিত করে।

মাপস টেকনোলজি

মাপস বর্তমানে সবচেয়ে আধুনিক টেকনোলজি যার মাধ্যমে মাপস ট্যাবলেটের মধ্যেই ট্যাবলেট এবং পিলেট ফিল্ড ক্যাপসুল এর উপকারী দিকগুলোর সবই পাওয়া যায়।

র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম মাপস ট্যাবলেটের সুবিধা

- সর্বোচ্চ বায়োএভেইলেবিলিটি নিশ্চিত করে।
- ড্রাগ রিলিজের পরিমাণ সবসময় একই থাকে।
- প্রতিদিন ১টি করে মাপস ট্যাবলেট।
- হঠাৎ করে ইন্সটাইনে অতিরিক্ত ওষুধের সম্ভাবনা (ডোজ ডাম্পিং) কমিয়ে দেয়।
- লোকালাইজড ইরিটেশনের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
- মাইক্রো পিলেটস যা সম্পূর্ণরূপে পাকস্থলি থেকে ইন্সটাইনে গিয়ে দ্রুত শোষিত হয়।

ফার্মাকোডাইনামিক সুবিধা

মাপস ট্যাবলেটের পিলেটস দ্রুত পাকস্থলি থেকে ইন্সটাইনে যায়। যার ফলে ইন্সটাইনের ওষুধ দ্রুত শোষিত হয়। এর কারণ হল পিলেটস এর আকার অনেক ছোট এবং যার ফলে অনেক বড় জায়গা নিয়ে এটি ইন্সটাইনে শোষিত হয়।

নির্দেশনা


- নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ জনিত আলসার।
- ডিউডেনাল আলসার।
- গ্যাস্ট্রোইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লক্স ডিজিজ
- রিফ্লক্স ইসোফ্যাজিটিস
- জলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম
- হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি চিকিৎসায় (এন্টিবায়োটিকের সাথে)

সেবনবিধি ও মাত্রা র্যাবিপেস মাপস ট্যাবলেট

নির্দেশনা	সেবনবিধি ও মাত্রা	সময়কাল
নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ জনিত আলসার।	২০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	৪-৮ সপ্তাহ
ডিউডেনাল আলসার	২০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	৪-৮ সপ্তাহ
গ্যাস্ট্রিক আলসার	৪০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	৪-৮ সপ্তাহ
গ্যাস্ট্রোইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লক্স ডিজিজ	২০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	৪ সপ্তাহ
হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি দমন	২০ মিগ্রা (সাথে এমক্সিসিলিন ১০০০ মিগ্রা এবং ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিগ্রা) প্রতিদিন দুইবার	৭ দিন
জলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম	৪০-৮০ মিগ্রা প্রতিদিন দুইবার	চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী
১২ বছর এবং এর উপরের বয়সের বাচ্চাদের সিম্পটোম্যাটিক গ্যাস্ট্রোইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লক্স ডিজিজ	২০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	৪-৮ সপ্তাহ
১ থেকে ১১ বছরের বাচ্চাদের সিম্পটোম্যাটিক গ্যাস্ট্রোইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লক্স ডিজিজ	১৫ কেজির কম ওজনঃ ৫ মিগ্রা প্রতিদিন একবার যদি কাজিত ফলাফল না পাওয়া যায় তাহলে ১০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার ১৫ কেজির বেশী ওজনঃ ১০ মিগ্রা প্রতিদিন একবার	১২ সপ্তাহ


মাপস ট্যাবলেটটি খাওয়ার আগে ও পরে খাওয়া যায়।

মাপস ট্যাবলেটটি এক গ্লাস পানি দিয়ে গিলে ফেলুন। মাপস ট্যাবলেটটি চুষে অথবা কাডমে খাবেন না।



অথবা

যদি রোগীর ওষুধ গিলে খেতে অসুবিধা হয় তাহলে মাপস ট্যাবলেটটি এক গ্লাস পানিতে রাখুন। তারপর পানি ঠিকমত নাড়ুন যাতে মাপস ট্যাবলেটটি গুলে যায়। মিশ্রণটি ৩০ মিনিটের মধ্যে খেতে হবে।



সেবনবিধি ও মাত্রা র্যাবিপেস ক্যাপসুল

ডিউডেনাল আলসার

প্রাণ্ডবয়স্ক: ৪ সপ্তাহের জন্য ২০ মিলিগ্রাম/দিন; কিছু রোগীর জন্য অতিরিক্ত থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে।

জিইআরডি এর স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা

প্রাণ্ডবয়স্ক এবং ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশু: ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন একবার ২০ মিলিগ্রাম। ইরোসিভ বা আলসারেটিভ জিইআরডি।

প্রাণ্ডবয়স্ক: ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের জন্য ২০ মিলিগ্রাম/দিন; আরোগ্য না হওয়া রোগীদের জন্য অতিরিক্ত ৮ সপ্তাহ বিবেচনা করা যেতে পারে। জিইআরডি এর রক্ষণাবেক্ষণ নিরাময়ের জন্য, ২০ মিলিগ্রাম/দিন।

প্যাথলজিক্যাল হাইপারসেক্রেটরি শর্ট

প্রাণ্ডবয়স্ক: ৬০ মিলিগ্রাম/দিন। পৃথক রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ডোজ সামঞ্জস্য করুন। প্রতিদিন ১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বা ৬০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ডোজ দিনে দুবার দেওয়া হয়েছে।

এইচ. পাইলোরি নির্মূল।

প্রাণ্ডবয়স্করা: র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম ২০ মিলিগ্রাম প্রাস অ্যামোক্সিসিলিন ১,০০০ মিলিগ্রাম প্রাস ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন দুবার ৭ দিনের জন্য সকাল এবং সন্ধ্যার খাবারের সাথে।

সাধারণ উপদেশ: ক্যাপসুল সম্পূর্ণ গিলে ফেলা উচিত; চিবান, চূর্ণ বা বিভক্ত না। খাবারের সাথে বা খাবার ছাড়া নিতে পারে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: ডায়রিয়া, বমিভাব এবং পেটব্যথা।

প্রতিনির্দেশনা: র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম বা এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সতর্কতা ও সাবধানতা: যে সকল রোগীদের লিভার এবং কিডনির সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে

গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম খুব বেশী দরকার হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। র্যাবিপ্রাজল সোডিয়াম মাতৃদুগ্ধে নিঃসরণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মায়ের উপকারিতার উপর নির্ভর করে ওষুধটির ব্যবহার থেকে বিরতি অথবা স্তন্যদানে বিরতির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ওয়ারফেরিন, সাইক্লোসপেরিন, কিটোকোনাজল, আয়রন সল্টস, ডিজিটলিন, মাইকোফেনোলেট মোফেটিল, এটাঞ্জানাভির, মিথোত্রেন্টেট এর সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

সংরক্ষণ:

র্যাবিপেস মাপস ট্যাবলেটঃ আলো থেকে দূরে, ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নীচে, অদ্রুতামুক্ত ও শুকনো স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

র্যাবিপেস ক্যাপসুলঃ আলো থেকে দূরে, ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে ও শুকনো স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ:

র্যাবিপেস মাপস ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাগে ৫ x ১০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকিং -এ আছে।

র্যাবিপেস এম১০ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাগে ৩ x ১০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকিং -এ আছে।

র্যাবিপেস ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাগে ৫ x ১০টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকিং -এ আছে।

প্রস্তুতকারক

বীকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি

ভালুকা, মহম্মনসিংহ, বাংলাদেশ